AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-6-10-75 92172

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION " LANGUEDOC-ROUSSILLON "

(AUDE - GARD - HERAULT - LOZERE - PYRENEES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE - BAT. 5 - PLACE CHAPTAL

34076 MONTPELLIER CEDEX - TEL. 92.28.72

ABONNEMENT ANNUEL : 30 F

Régisseur de recettes de la D.D.A.

C.C.P. Montpellier 5238-57

nouvelle série

2ème année - n° 31

Imprimerie de la Station "Languedoc-Roussillon" - Directeur-gérant P. JOURNET

ABRICOTIER

Monilia : Ce sont les fruits momifiés restant sur les organes morts par suite des attaques de la maladie qui assurent la conservation de la maladie. Il convient donc à l'automne, avant la chute des feuilles (ce qui facilite le travail) d'éliminer ces sources futures d'infection par un émondage soigné.

Cheimatobie : Avant la montée des femelles pondeuses, la pratique des bandes de glu est toujours recommandable, elle permet de se dispenser d'une ou deux interventions chimiques printanières.

CERISIER

Cheimatobie : Même observation que pour l'abricotier.

LES NOCTUELLES

On désigne sous le nom de noctuelles des lépidoptères dont les larves (souvent de moeurs nocturnes) vivent sur et dans le sol superficiel, quelques espèces ont des larves aériennes.

Beaucoup de ces chenilles étant de couleur grises elles sont alors appelées "vers gris".

La plupart des cultures sont plus ou moins attaquées par les noctuelles : légumes, céréales, vigne au printemps et parfois peu avant la récolte, les pêches, les pommes sont également victimes de ces ravageurs. Les espèces de noctuelles étant très nombreuses, seuls les papillons peuvent permettre une identification précise, l'alimentation et l'âge modifiant la couleur des chenilles.

Selon l'espèce, les dégâts se produisent ou se répètent au printemps, en été, à l'automne.

Au printemps la lutte par appats (protection du vignoble au débourrement) est efficace. On peut en toute saison pulvériser du lindane, du toxaphène ou de l'endosulfan à raison de 1 000 l de solution par hectare.

Le Chef de Circonscription,

P. BERVILLE

Les Ingénieurs,

CHRESTIAN - TROUILLON

Tirage du 3 Octobre 1975 - 1 450 exemplaires.

Le bulletin n° 30 n'a été adressé qu'aux oléiculteurs

P 160